

ควรฉีดวัคซีนอะไรดี ?

ระหว่างรอวัคซีนป้องกันโควิด-19

เพื่อ **โควิด-19** ระบาด

วัคซีนไขหวัดใหญ่

ในผู้ใหญ่ทุกคน

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จากเชื้อนิวโมคอคคัส

- ผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ ไตวายเรื้อรัง โรคตับแข็ง และเบาหวาน
- ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ประโยชน์

ลดโอกาสติดเชื้อ
ร่วมกับโควิด -19

รู้หรือไม่

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีการติดเชื้อไขหวัดใหญ่ร่วมด้วย
จะมีอัตราการตายเพิ่มเป็น 2 เท่า

- ลดความรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตจากไขหวัดใหญ่และปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส
- ลดการเจ็บป่วยซ้ำ และลดการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองลงประมาณ 30%

รู้หรือไม่

ไขหวัดใหญ่เป็นเหตุกระตุ้นทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
มีอาการกำเริบจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดและรับวัคซีนได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพดี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลอภัยบ้านแพ้ว

หมายเหตุ : เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป สามารถเข้ารับวัคซีนไขหวัดใหญ่ได้
โดยขอคำแนะนำได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม โทร.034-419555 ต่อ 1109

โทร.034-484030

(เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 07.00-15.00 น.)